

ERBIUM LASER DERMABLATE COOLLASER

INFORMOVANÝ SOUHLAS

Klient/ka :

RČ:

Telefon : E-mail :

Ošetřovaná plocha :

Na základě Vašeho požadavku a předchozího vyšetření a konzultace Vám ošetřující lékař doporučil ošetření Erbium Laserem Dermablade Coollaser. Máte právo se o podstoupení zákroku svobodně rozhodnout, pokud jiné právní předpisy toto právo nevylučují. K provedení výkonu je potřeba Vašeho souhlasu.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Ošetření erbium laserem Dermablade Coollaser je minimálně invazivní metoda využívající laserové záření o vlnové délce 2940 nm k odstranění vrchních vrstev pokožky. Ošetření je určeno k:

- redukci jemných vrásek a hlubších rýh,
- zlepšení textury a elasticity pokožky,
- odstranění jizev (např. po akné) a strií,
- zlepšení pigmentových nepravidlostí,
- odstranění benigních kožních útvarů (např. bradavic, seboroických keratóz, nežádoucích výrůstků).

PRŮBĚH OŠETŘENÍ

- Příprava: Ošetřovaná oblast je očištěna a dezinfikována.
- Anestezie: V případě hlubšího zákroku může být aplikován anestetický krém nebo lokální injekční anestezie.
- Ošetření: Laser je aplikován na ošetřovanou oblast. Délka ošetření závisí na rozsahu zákroku a obvykle trvá 15 až 45 minut.
- Po ošetření: Ošetřená oblast může být ošetřena chladičným gelem nebo speciálním krémem na zklidnění pokožky.

POOPERAČNÍ PÉČE A HOJENÍ

- Bezprostředně po zákroku se může objevit zarudnutí, otok a mírné pálení v ošetřované oblasti.
- V prvních dnech se může vytvořit jemná krusta, která se přirozeně sloupne během 5–7 dní.
- Kůže může být citlivá až 2 týdny po zákroku.
- Plné zhojení pokožky a dosažení konečného efektu může trvat 4–6 týdnů, novotvorba kolagenu dobíhá ještě několik měsíců po ošetření.
- **Doporučuje se používat hydratační krémy, vyhýbat se přímému slunečnímu záření a aplikovat ochranný krém s SPF 50 po dobu alespoň 6-8 týdnů.**

KONTRAINDIKACE

Ošetření erbium laserem není vhodné v následujících případech:

- těhotenství a kojení,
- aktivní opar (herpes simplex) nebo jiná virová, bakteriální nebo plísňová infekce v ošetřované oblasti,
- nedávné opalování nebo použití samoopalovacích přípravků,
- poruchy hojení kůže (např. keloidní jizvy),
- užívání léků zvyšujících citlivost na světlo (např. některá antibiotika, isotretinoin),
- autoimunitní onemocnění postihující kůži (např. lupus),
- přítomnost nádorových změn v ošetřované oblasti,
- cukrovka (diabetes) nebo jiná chronická onemocnění ovlivňující hojení.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY A KOMPLIKACE

Možné vedlejší účinky po ošetření mohou zahrnovat:

- přechodné zarudnutí, otok a podráždění,
- jemné krvácení v ošetřované oblasti,
- hyperpigmentace nebo hypopigmentace (změna barvy kůže),
- tvorba puchýřků, krust nebo jemných jizev,
- přetrvávající zarudnutí nebo svědění,
- reaktivace oparu (u osob s anamnézou oparu).

Vzácně může dojít k:

- infekci ošetřované oblasti,
- tvorbě hypertrofických nebo keloidních jizev,
- alergické reakci na anestetika nebo ošetřující přípravky.

Prohlašuji, že jsem byl/a poučen/a o svém právu klást otázky a svobodně se rozhodnout, zda s navrženou zdravotní službou či zdravotním výkonem souhlasím či nikoliv. Podaným informacím rozumím, nemám žádné další otázky, ani nejasnosti, a vyslovuji svůj svobodný informovaný souhlas s uvedenými zdravotními službami a výkony .

Souhlasím s pořizováním fotodokumentace z důvodu objektivního zhodnocení výsledku.

Datum podpisu:

Podpis klienta/ky:

Podpis lékaře: